

Requisitos de vacunación del Estado de Nueva York para ingresar y asistir a la escuela

Vacunas	Pre-kinder (guardería infantil, casa-cuna, Head Start o pre-kinder)	Escuela (k-12)
Vacuna con toxoide contra la difteria	3 dosis (4 dosis en las escuelas de la Ciudad de Nueva York)	3 dosis (En las escuelas de la Ciudad de Nueva York se requieren 4 dosis para kinder solamente)
Vacuna con toxoide contra el tétano y Vacuna contra la tosferina (DTaP, DTP)	3 dosis si nació el 1° de enero de 2005 o después	No corresponde hasta que el alumno nacido del 1° de enero de 2005 en adelante se inscriba en la escuela
Refuerzo contra tétano, difteria y tosferina (Tdap)	No corresponde	Nacido del 1° de enero de 1994 en adelante y por inscribirse en sexto grado
Polio (IPV u OPV)	3 dosis	3 dosis
Sarampión, paperas y rubéola (MMR)	1 dosis	2 dosis de una vacuna que contenga sarampión y 1 dosis de paperas y de rubéola (preferiblemente como MMR)
Hepatitis B	3 dosis	3 dosis
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	3 dosis si es menor de 15 meses de edad o 1 dosis administrada cuando cumpla los 15 meses de edad o después	No corresponde
Vacuna con conjugado neumocócico (PCV)	Nacido el 1° de enero de 2008 o después 4 dosis antes de cumplir los 15 meses de edad, administradas a edades e intervalos adecuados	No corresponde
Varicela	Nacido el 1° de enero de 2000 o después 1 dosis	Nacido el 1° de enero de 1998 o después o nacido el 1° de enero de 1994 o después y por inscribirse en el sexto grado 1 dosis